DE

)XARTHROCACE.

DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM

TIOSI MEDICORUM ORDINIS
AUCTORITATE ET CONSENSU
IN
RSITATE LITTERARIA BEROLINENSI
AD SUMMOS
CINAE ET CHIRURGIAE HONORES
RITE IMPETRANDOS
PUBLICE DEFENDET
AUCTOR

OL. LUDOV. LEHMANN
BEROLINENSIS

NTIBUS UTRIUSQUE MEDICINAE DOCTORIBUS
RUDOLPH, SCHULZ, LINDEN

I. M. DECEMBRIS A. MDCCCXXI.
H. L. Q. S.

BEROLINI.
IOANNIS FRIDERICI STARCKII.

VIRO

UMMO ILLUSTRI, AMPLISSIMO

RISTOPHORO KNAPE

USQUE MEDICINAE DOCTORI, PROFESSORI

PUBLICO ORDINARIO, REGI A CONSILIIS

INTIMIS ETC. ETC.

PRAECEPTORI PIE COLENDO

HASCE

'UDIORUM SUORUM

PRIMITIAS

GRATA OFFERT MENTE

AUCTOR.

riffima et una perfertur medicorum ab omni antiquitate voce, femur lente crebrius, labe am partium articuli contracta, quam externis ntis cauffis fede fua excidere. Quod inftin- complures, neglectis indubiis luxationum, ex- s infultus fequentium, cafibus, quamlibet fe- s deviationem a pravitate derivare, de qua exi- differuerunt de Haenius, [1]) Fordius, [2]) Ficke-) et Alberfius [4]), in eo tamen lapfi, quod ni- irctis limitibus ftringerent eam ftatuerentque coxae propriam, fallis idcirco coxarii morbi, giae nominibus potiti. Egregia autem huic

---

Antonii de Haen pars quarta rationis medendi. Edi- tia. Vindobonae 1764. — Cap. IV. De coxaria morbo . sq.

Eduard Fords Bemerkungen über die Krankheit des elenks. A. d. Engl. Breslau. Hirfchberg und Liffa.

4) *Preisfrage. Worin befteht eigentlich das Uebel, iter dem fogenannten freiwilligen Hinken der Kin- kannt ift? Beantwortet von I. A. Albers — von Vilhelm Anton Ficker. Wien.* 1807.

adfectui lux adfulfit ex arthrocacologia Rufti[1] fimili vitio omnes articulos corrigi poffe ftabili fanioraque de vera eius indole nobiscum com nicantis, digni qui prae omnibus audiatur.

Brevibus liceat hic femoris lentae fic di dislocationis imaginem exhibere et medelam.

Morbi hypotypofis.

Dislocationis femoris lentae, confequut coxarthrocaces denominatione valetudo venit, q prodiens ex anomala partium articuli vita, ci perficitur feriorive femoris e cotyloidea cavea ceffu.

Phaenomenologia.

Coxarthrocace quatuor percurrit probe iunctas periodos, quarum prima (ftadium infl matorium) dolorifico proditur articuli adfectu fi mae debilitatis fenfu, citra omnem a fueta for deflexum, fecunda (ftadium pararthrematis) form mixtionisque perfpicua alienatione, incipiente moris declinatione et productione. Orditur te

---

1) *Arthrokakologie oder über die Verrenkungen du innere Bedingungen von Iohann Nepomuk Ruft. W* 1817.

lus (ſtadium luxationis), oſſis compage magis
que deleta, cum perfecta capitis femoris ex
lari ſinu egreſſu, ambeuntium partium cor-
a, ſaniei larga per ſinuoſa ulcera profuſione
aque febre cum colliquationibus quartae
ulcerationis) introitum denotantibus. Quae
uentibus ſat elucefcent.

Iullis praeviis ſymptomatibus dolor articulum
it ſpecificus, acutus, moleſtiſſimus, ſuccuſſio-
electricarum in modum per nervorum de-
n ad medium usque femur, rarius ad genu
ısus. Concubia nocte, accenſa febricula au-
momento citius emergit, manu fortiter tro-
eris maioris foſſae impacta. Iners queritur
us membrum, levi iam intentione, matutinis
pue horis et poſt quietem ſummo confe-
Doloris evanidi, pro tempore ſaltem, inful-
oem iniiciunt aegrotanti, fore, ut ſponte in-
is reſtituatur.

ugeſcit interea inanitio et debilitas ita, ut
ns interpelletur, cogaturque quieſcere. In-
incertus, titubans, claudicatio. Recrudeſcen-
r periodos cruciatus caveas derives ab inno-
xternis influxibus maiorique utaris praecau-
in infantibus, qui nec de cauſſarum indole
t nec de dolore quidquam praedicare.

Moratur haec morbi facies vel per brevi-mum tempus, vel in longius porrigitur, impar qui decipiat medicum, defectu aliarum claudicatio conditionum, periodica doloris natura et quod a fecti lateris pes a normali deflectatur direction extrorſum faepiſſime verſus, paſſionis indolem vinantem. Falluntur qui prolongatum iam fem contendunt, hoc phaenomeno ſecundae perio ſtatim deſcribendae, initium denotante.

In ea femur laxum, tabidum, ſano longi trochanter maior profundius extrorſumque coll catus, deſidentes glutaei, intenti, transverſa cren humilior. Optime hos perſpicies deflexus, dum homo ſupinus cubat, aut adductis ſtat cruribu contiguisque plantarum interioribus marginibus. Priori in caſu trochanter, genu malleolusque affecti membri decliviorem obtinent ſitum, in ulteriori flexum prominet genu. Inceſſus poſitusque is, ut extenſo ſano femore flectatur aegrotum longius, pede extrorſum voluto.

Monendum tamen non ubivis productionem eam reperiri, ſed deſiderari praeſente oſſium pelvis carie, qua ilium os coſtas verſum adſcendit, cui rei lucem foenerantur altior dolentis tumidique ilium oſſis poſitus, ſpinae ſuperioris poſterioris eius a trochantere maior diſtantia, ſymphyſeos

cro-iliacae laxitas, corpus in adfectum latus
oclive. Tolerabili articuli dolore, motu haud
aviter cohibito, excipias licet lateralem adducto-
ım, glifcit malum, aucta mufculorum tenfione,
dolefcenteque, fummopere noctu, genu. Quod
b periodi finem tam patibile, ut nec leviffimam
'at contrectationem, eo facilius morbi fedes fta-
tur, quo magis tumidum aliove modo mutatum
rcipitur, quoque magis coxae dolor defedit, ad-
ɔita et fortiffima preffione, ob renitentes forfan
ıfculos, haud provocandus; Accedunt dolentes
ʒuinalium glandularum tumores, macie confici-
' femur, augetur claudicatio continuisque info-
ıiis urgentibusque doloribus arceffitur febris, qua
errime extenuatur corpus. Hac larva induta
etudo per incertum moratur tempus, externis
ıefertim influxibus momento citius in tertiam
nsgreffura periodum.

Breviorem haec offert pedem, luxati femoris
ɔite glutaeis furfum poftrorfumque ducto, tumi-
dam, globofam, duram clunem. (Deftructo pe-
ıs articulo, reforbentiumque vaforum incitata
ione e medio fublato femoris capite, breviorem
i pedem citra luxationem liquet, quam brevi-
ɜm, a mediocri, fub fecundae periodi finem
ıd infrequenter, obvia, optime dipefces, fi me-

mineris liberiori motu ſtipatam hanc incede clunemque collapſam iunctam habere. — Rar ſime femur verſus foramen ovale expellitur. (Q facto cognoſcitur id vitium, evectis ſecundae p riodi ad ſummum gradum ſymptomatibus, e m iori pedis longitudine, trochantere interiora ma ſpectante, inguine tumente, femore extenſo, cru ſemiflexo.) Pedis introrſum voluti planta, ſolo a figi nequit, nititur digitorum apicibus aeger, co pus ſanum latus verſum inclinans, quo ſubven laeſo membro. Adſcendit, perpetua capitis femo ris preſſione, ilium os, attrahitur, flexo genu, a abdomen femur, ut intentorum muſculorum laxita conſequatur. Diriſſimos in quovis extendendi co natu patitur dolores aegrotus, levaminis, ineunt periodo, ſpecie falſus. Exaſperatur febris, acce dentibus ſudoribus profuſis, viſcidis, urina oleagi nea cuticula aut verſicolore obducta, alvo fuſa.

Tumor, per totum femur ſparſus, ſplendens a collecto fluctuans humore, cutis decoloris, livi dae, ulceribus exeſio, gonalgia pertinax, recrude ſcentes coxae cruciatus, ſummum denotant morb vigorem. Effluit latex, lymphaticus protinus, in ulceroſam ſubito dein mutatus ſaniem, qua copio ſiſſima proſternuntur vires morsque, unicum per fugium atque ſolatium acceleratur. Mirum tamen

ntum valeat natura ad removendas graviſſimas
vitates, mirum, quam magno impendio, expul-
emortuis particulis, claudat ulcerationis fontes
etque hecticam febrem, coalitis oſſibus mobili-
e iunctis partium uſum, impeditiorem licet,
uo interdum reſtitutura.

Disquiſita, in prima morbi periodo defuncto-
ı corpora caput femoris vel parum mutatum
e auctum, ſuperne integerrimum, vel ad tro-
nterem usque tumidum, ſpongioſum oſtenderunt,
a ulla manticulae, ligamentorum aliarumve par-
n mollium vitia adiuncta.

Depravatum magis in ſecunda periodo inveni-
os, manticulae incumbens aut ad marcidam
rptamque acetabuli crepidinem attractum, ſy-
iae haud infrequens accumulatio, inflammata,
ſa, ligamenta, foedae corruptela cartilagines
ſaque interarticularis; rarior capitis oſſis ſolu-
cum ſaniei intra caveam manticulae collectione.

Summa conſpicua in ulterioribus mali ſtadiis
a, quae aegerrime pro phaenomenorum ſaltem
centu, exſpectaveris. Ligamenta, maſſa adi-
o-glanduloſa, indumenta articuli cartilaginea
rupta, coxae ſinus aeque ac contiguae innomi-
i oſſis partes carie ſoluta, fungoſis obſita ex-
ſcentiis, marcidae carnes. Femoris caput ex

toto deficiens aut magis minusve inflatum, fo
minis ovalis ambitui innixum, ilium offi aliis
Ex faniei in pelvis caveam, perfoffo acetabuli fu
do, defcenfu, offis facri lumbaliumque vertebram
erofiones. — Quae poft fuperatum, natura m
dicatrice, morbum diffecta fuerunt corpora, a
cylofes patefecerunt arctiffimas, concretam extr
mam femoris partem cum variis innominati o
locis, evanidam cotyloideam caveam ut nec le
eius superfuerit veftigium. Interdum caput nova
fibi finxit fedem, in qua coalitis mufculis coace
vataque cellulari tela retentum, motibus vacav
fat liberis. Mutatis, prava partium configuration
adhaefionum mufculorum diftantiis, hos vario mod
torqueri, laxari appropinquatis, distendi a fe inv
cem recedentibus. preffis nervis et vafis nutritio
nem turbari, ut marcefcat femur, depravari for
mam pelvis pofitumque adeo, ut nullam fervet
everfis plane diametris, cum fano ftatu fimilitudi
nem, palam.

Teterrimum malum, cognitu haud difficile
cum nonnullis attamen aegritudinibus, cum con
genita praecipue claudicatione eaque, quae fym
phyfeos facro-iliacae laxitati ortum debet, cum ner
vofa ifchiade et abfceffu lumbali, levi adhibita
praecautione, commutandum ab his fymptomati
bus dispefces, ftatim proponendis.

Congenita claudicatio, [1]) ex anomala coxae rmatione, deficiente penitus femoris collo, yſi oſſis cum capite ita coalita, ut trochanter id efferatur, tereti ligamento ambitum ca- adgrediente, femur exhibet ab initio inde ab- atum, horizontali aegri ſitu fixaque pelvi ad i longitudinem, leviſſima iam extenſione, ci- olorem, producendum, remota hac, priſtinas recuperaturum rationes. Recta deſcendunt et pes; abbreviati femoris clunis alteri ſimilis lanior; transverſa crena alteri quo ad altitudi- eſpondens; integra membri nutritio parumve ma deflectens; liber articuli motus; planta gradiendo ſolo adfixa.

a coxarthrocace primo nullus longitudinis de- dein productio, quam celerrime excipit no- or contractio, quam quae in congenita un- invenitur claudicatione; extenſio ſub diris cru- us vana; pes et genu in alterutrum latus aber- ; contracto femore prominens clunis, humi- rena; tabidum femur, hectica conſpicua fe- notus impeditiſſimus; digitorum apicibus inter ndum nixus aeger.

Palletta: de claudicatione congenita in adverſariis Modiolani 1788.

Quae ex adſcenſu fit innominati oſſis, l
ſymphyſi ſacro-iliaca, claudicatio, a Morgagnio
primo illuſtrata, principio citra notabilem form
articuli deflexum, ingreſſum molitur facilior
poſt protractam quietem; cohibitum poſt int
tionem. Dum erectus ſtat aeger, altius os ili
tangitur, ſpina poſterior ſuperior extrorſum pr
minula, tumorem efficiens durum, lateralis oſſis
cri margo protuberans. Membrum ab initio in
brevius; facilis femoris ex tenſione haudque do
rifica productio; corpus, ſanum alias, in adfect
latus inter gradiendum proclive; formato malo,
ſpina dorſi, in oppoſitum latus, curva claudicat
mitior; dolor nullus.

In coxarthrocace ſummae debilitatis ſenſus ex
quiete, deficiens protracto uſu; mutua partium
ratio primo illaeſa; femoris productio; dolores e
irritis extendendi conatibus; declinatio in ſanu
latus; nulla ſpinae curvatura; dolor genu ſympto-
maticus; valetudo ſummopere adverſa.

Iſchias nervoſa poſtica, [2]) acutiſſimo dolore

---

[1]) Epiſtola anatomica 65. 19. *Benjamin Bells Lehrbe-griff der Wundarzneikunst. A. d. Engl. Dritte Aus-gabe. Th. 7. S.* 266.

[2]) *Dominikus Cotunni Abhandl. vom nervigen Hüft-weh. A. d. Lat. Leipzig* 1792.

saeviente ischiadicique nervi cursum a sacro ad externum malleolum plantaeque adiacen- partem usque sequente, incessu cohibito, tro- teris positu eodem, nulla femoris per totam i moram productione raraque contractis mu- atque sat exigua brevitate a coxarthrocace epat, in qua nullus initio dolor aut ad supe- m anteriorem femoris partem circumscriptus, or membri usus, varius trochanteris pro va- norbi periodis positus, productio in prima pe- nulla, dein perspicua, celeriter in brevitatem gressura.

Abscessum lumbalem [1]) maior intercedit coxarthrocacen adfinitas, cum in utroque declivitas, dein tumor clunis reperiatur, ul- fistulosa in similibus proveniant locis, cor- erigi haud possit, femur difficillime extendatur datque claudicatio cum notabilibus sanitatis onibus. Differt autem abscessus lumbalis eo, dolor, lumbali regioni infestus, quovis incre- motu, trochanter naturalem retineat sedem; femoris longitudinis anomalia percipienda, ır extrorsum verti nequeat, tumor qualibet ab- inalium musculorum intentione, tussiendo, vo-

---

[1]) Henrici Callisen systema chirurgiae hodiernae. Vol. quarta Hafniae 1815. p. 416. §. 776.

ciferando, desidendi conatibus propellatur; subsi-
dum cubat aeger, cum in coxarthrocace dolor e-
ficiat, pro tempore cesset, coxae genuve insidens
trochanteris positus mutetur, femur exteriora sp-
ctet tumorque, contractis abdominalibus muscu-
idem persistat.

Phlegmasia alba dolens, puerperis praecipue familiaris, licet et viris infesta,[1]) initio cum coxarthrocace confundenda, quod impeditum motum, claudicationem genuque dolorem adiuncta habeat, deficiente longitudinis femoris aberratione, dum ad altissimum gradum evecta est gonalgia et in ulteriori morbi progressu, propagato per totum membrum tumore, dolore in immensum aucto cum motu abolito ab hac dignoscetur.

Anomaliis formae positusque femoris laesaeque eius functioni, luxationi, fracturae colli diaphyseosque secessui propriis, caussas haud aegre revelaturis, non immoremur.

A e t i o l o g i a.

Inquisiturum in morbi ortum decet, principio manifestas recensere caussas, dein subiicere de vera morbi indole probabilia.

---

[1]) *Archiv für die medicinische Erfahrung herausgegeben von den ord. öffentl. Lehrern der Heilkunde* Dr. *Horn*, Dr. *Nasse*, Dr. *Henke*, Dr. *Wagner*. *Jahrgang* 1821. *Januar*, *Februar*. *S.* 136.

Oriundo vitio, omni familiari aetati, ut et enitum [1]) ſit obſervatum, anſam praebere exias plurimas, ſcrofulas, [2]) rhachitidem, ſy-lem, [3]) nemo inſicias ibit, qui harum hiſto-ſedulo perſcrutatus fuerit quique intimae me-rit earum relationis ad oſſeum ſyſtema. Rheu-mus [4]) ex frigore, corpore excepto aut in-metallicorum remediorum, Mercurii prae-, adminiſtratione contractus, haud infre-merito accuſatur mali fons.

uppreſſae impetigines, ulcera praepoſtere ſic-exanthemata varia, male ſoluta, prae omni-riolae, [5]) non ſemel producendo, celerri-

---

Ficker l. c. S. I.

D. Caroli Georg. Theod. Kortum commentarius de ofuloſo quique inde pendent morbis ſecundariis T. 2. iae 1789. 90. Tom. I. Sect. 2. §. 9. p. 81. T. 1. Cap. 2. §. 103. p. 293. ſq. Curtii Sprengel inſtitutio-nologiae generalis. Amſtelodami 1813. L. 2. Cap. 3. p. 412.

Ueber die Erkenntniſs und Cur der chroniſchen eiten des menſchlichen Organiſmus von Dr. *Wil-ndreas Haaſe. B.* 3. *Abth.* 2. §. 806. *Seite* 604. 5.

Haaſe l. c. Th. 2. §. 218. Seit. 339. Sprengel inſtitu-athologiae ſpecialis. Amſtelodami 1814. Lib. 1. Cap. p. 82. 83.

Reil über die Erkenntniſs und Cur der Fieber Th. §. 61. S. 304.

inum tunc decurfum celebraturo, morbo pa[...] fuere, qui et a metaftaticis [1]) furrexiffe febriliu[...] aliorumve adfectuum, haemorrhagiarum, depo[...]tionibus vifus eft.

Plurimum autem, ut emergat malum, ex[...]nae valent violentiae, e genu trochantereque [...] articulum delatae ibique circumfcriptae, leviffi[...] iam fufficientibus, vigente quadam interna cau[...]

An difpofitio quaedam faveat adfectionis [...]tui, ambigitur, licet nec rationi contrarium fit, [...] experientia refragetur, infantile corpus, ob ma[...]rem univerfim teneritatem praevalentemque offiu[...] vitam in eam magis proclive effe, cui acced[...] quod miafmaticis facillime corripiantur morb[...] et dyscrafiis quodque externis faepius ferian[...] inopinato influxibus. Sequiorem fexum, ob ea[...]dem teneritatem et ob discrepantem articuli ftr[...]cturam, aeque ac nonnullos ordines prae aliis co[...]ripi, a veritate alienum.

Varia fuerunt de proxima morbi cauff[...] ab omni inde tempore, commenta. Tacen[...] de ea Hippocrates et Celfus. Placuit fequ[...]tibus intumefcentias arguere modo inflamm[...]torias atque pravitates manticulae cartila[...]numque, articulares fuperficies veftientium, iam[...]

---

1) Callifen l. c. §. 735. p. 423.

oviae accumulationem pravamque indolem, nunc :ae ſinus exoſtoſes. Fordius primus a capitis s femoris carie morbum derivat, adſtipulante ſtio, [1]) qui aſſumta dynamica principio adfe-one, interni ſcilicet perioſtei inflammatione ea-: in ulcerationem prona, qua adgrediatur ipſum ut ab intimis penetralibus inde ad peripheriam datur deſtructisque vicinis partibus ſedem lin-it, morbi fontes recludi cenſet, eo fultus, quod norum phaenomenorum ſyndrome, dolor, tu-r, functio laeſa cum febrilibus motibus inflamma-um characterem citra omnem dubitationis m ponant, quod remotarum cauſſarum pluri-e, dyscraſia arthritica, rhachitica aliaeque oſſi-, eorumque articularibus infeſtae ſint partibus uod ſectiones, ineunte morbo inſtitutae, labem emoris caput ſinitam doceant. In opprobrium : explicationi verti nequit, ſanum haud raro niri femur, deleta cotyloidea cavea, cuius rei norabile exemplum (iuvenis viginti annorum pletam utriusque coxae ſinus deſtructionem ex matiſmo ſibi contraxerat, integerrimis femo-capitibus) aeſtivo ſemeſtri anni milleſimi octin-

---

[1]) l. c. 124. S. 18.

gentesimi decimi quinti in caritatis nosocomio ob servare mihi contigit, statu hoc ab alienae long indolis adfectibus, puris intra pelvis caveam cum lationem inferentibus, deducendo, quam extro sum vergentem serum sequitur aut nullum femo ris ipsius pathema.

Prognosis.

Neminem, dignitatem articuli positumque pro contemplantem, fugit, maximi momenti instar ha bere aegritudinem ut et ordientis anceps sit at que dubium praesagium formandum. Peioris id erit notae, quo magis internae urgent caussae, dif ficiles adgressu; quo plures conspirant ad produ cendum morbum, quo graviora accedunt mala, caussali nexu aliove detenta, quo provectior aetas, quo pravior constitutio, quo aegrius moderandi externarum rerum influxus. Bonum exitum con tra augurari iubent oppositae conditiones primae que mali periodi, cum in ulterioribus vix ac ne vix quidem liceat restitutionis sibi polliceri spem ut et vita plane sit desperanda.

Therapia.

Aegrotantis saluti consulturum oportet remo tas mali aufferre aut innocuas reddere caussas, ipsi

leri adſectui pro expoſita ſua natura proque
is, quos attigerit gradibus, reſpicere denique
ſequutiva vitia aliave adiuncta.

Cauſſas remotas varium deſiderare medicami-
ı delectum liquet. Scrofuloſa cachexia et rha-
ica ſtrenuo debellantur Antimonialium, Mer-
alium, Dulcamarae, Conii, Digitalis aliorum-
uſu ut et inveteratus rheumatiſmus, ſyphilis
curio. Repercuſſa exanthemata ulceraque ſic-
in cutim revocanda irritantibus inunctis, epi-
ıatibus, balneis univerſalibus, quae et optime
ılantur in prioribus caſibus. Simile auxilii ge-
febrilium morborum convenit metaſtaſibus,
hlogiſtica methodus externis violentiis. Id au-
probe tenendum, ne nimis anxie cauſſali in-
ioni explendae operam navantes, ſero am-
amur curativam, cum, refractariis morbi con-
ıibus iisque aegerrime coërcendis, ad tantam
ehatur nonnunquam altitudinem, ut imparia
endo ſint et naturae et artis moſimina.

Jt curativae ſatisfiat indicationi eligantur ne-
remedia, mali naturae, pro ſingulis periodis
ſae, conſentanea. Quae cum in inflammato-
rincipio verſetur telae medullaris adfectione,
ıe adgredietur apparatu antiphlogiſtico iisque
idiis, quae irruentem nimia vi ſanguinem in

contrarias partes derivare valent. Vena secta hunc detrahendum esse urgent vehementissimi dolores, celeris morbi, externos insultus sequentis metastasesque evolutio, iuvenilis aegrotantis aetas, vegetae vires repetendumque id erit auxilium, quoad uno persistit malum vigore aut quoties demersa phaenomena iterum augescunt. Nec negligantur apta interna remedia, nitrum etc. ad cuius indolem, ob salinas, quas continet particulas, extractum pampinorum Vitis, a celeberrimo Petro Frankio usurpatum, accedere videtur.

Sufficiunt depletiones vasorum locales morbo iam infracto mitiorive larva induto, appositis hirudinibus, cucurbitulis cum ferro [1]) aut scarificationibus perpetrandae. Epithemata frigida, sal ammoniacus, natrum sulfuricum, muriaticum, nitrum, aceto et aqua soluta, ipsa glacies et nix commode articulo superimponuntur, ni aegrotantis teneritas ac in spasmos proclivitas ortusque mali ex anomala turbataque cutis functione nobis dissuadeant hanc curationem, summo utilem, vigentibus solis externis caussis. Ambiguum de fomentorum calidorum, aromaticorum, spirituosorum salubritate

---

[1]) Aur. Corn. Celsi de medicina libri octo. L. IV Cap. 22.

ium, quae, effectus in laesam partem difficul-
xsertura, nocent saepissime haud vitando per-
rio; aeque ambigua emplastrorum, servandae
cipue aequabili temperiei aptorum merita.
a cum fruge sicco utimur calore, cineribus,
a, furfuribus calidis, cataplasmatibus aromati-
volatilibus linimentis, optima, unguentis irri-
bus, e Tartaro emetico, ex Ammonii caustici
ore cum sebo, epispastico, cui Mercurium nu-
: sublimatum Antimoniique butyrum, sinapi-
et vesicantibus, quae omnia, dum inflammatio-
speciem in cute cient secretionemque moliun-
pravae, per antagonismum finem imponunt
ularium partium activitati. Insignibus nunc
ooris medici efferunt Mercurium laudibus, qui,
ua prius quantitate in usum vocatus, potuit
ibilem efficaciam, qua, larga manu adhibitus,
spicuus est, nullo modo exserere. Illinatur au-
unguentum neapolitanum ad drachmas duas
:ulo ipsi aut superiori internae femoris parti,
ec disparuerit ex toto malum, aut donec ptya-
us ulterius progrediendum esse vetet, refricato
ore iterum usurpandum. Perfectam ex eo, te-
s balneis adiuto, surgentis mali sanationem ex-
:tare, licet, formati semper levamen.

Formae articuli mutatio, impeditior motus,

acerrimus dolor, prolongatum femur, crefcentis mali indicia, propofitorum remediorum vires eludentis, conftantiffimo fortiffimoque irritamento opus effe nos docent, quo arceatur articuli pravitas, iuvetur promoveaturque effuforum laticum reforptio. Cui confilio fonticulos [1]) refpondere crediderunt, quos in anteriore articuli facie tam magnos excitarunt, ut facili negotio fedecim pifa et ultra retinerent. Elegerunt poftea, ne vicinum nervum vafaque cruralia laederent, trochanteris maioris foffam. Adverfantur laudato fonticulorum fucceffui experientiae Ruftii, [2]) qui, licet periodorum primarum retardatum progreffum ex iis obfervaverit, nunquam eorum ufu malo perfecte potiri potuit, quin, facta iam dislocatione depravationem maturaffe tabumque fibi viderentur, ocyus, lapide cauftico, ut ftruerentur adhibito, quo mirum quantum infracta partium vis vitalis labafcat deleaturque. Hippocratis Celfique auctoritate nixus, ad cauterium refugit actuale, immerito potentiali comparatum, quod celerrima fuperat, conftante et perfeverante, quam ciet, locorum exagitatione facilique gradus modique applicationis determina-

---

[1]) Callifen l. c. §. 676. p. 347.
[2]) l. c. §. 144. S. 98.

one, et moxae ceterisque praeſtans cauſticis, quod inorem momentaneumque adferens dolorem, prondas, ut perſpicuiores exſerant actus, partes ſtiulet. Utitur Ruſtius ferro priſmatico, facile mondo, mole ſua calorem ligante, quod imo applitum angulo, exiguam ſtriam cutis momento cis delens, adiacentem vita mirifice impertitur, ut, flammatione ſuborta, articuli anomalam activitem ſilere iubeat, ita, ut fortiter appreſſum ſtanque ut refrixerit cum alio mutatum ſupra clum partemque articuli poſticam ducat ſtriasque es aut quinque inurat, intimam ſex pollices longm ſequentium quasque pollice breviores, extream ipſi trochanteri maiori ſuperiacentem, ſinlas ultra pollicem a ſe invicem diſtantes, ne ex to corrumpantur integumenta profuſaeque nis ſuppurationi locus concedatur. Qua ubi ob teriorem mali provectioremque egemus ſtatum, time per ſcripula aliquot horae ſecundaria cum ri una aliave ſuperficie in trochanteris maioris ſa moramur, fonticulum ibi dein excitaturi.

Uſtione peracta, coxae ſubſidit aeque ac genu lor, motus liberior fit, minuitur mirum in mom femoris longitudo, erythemate per totum arularis regionis ambitum ſparſo, celeriter evanente. Sub diris cruciatibus, vegetioris vitae nun-

ciis, poſt biduum aut quatriduum recrudeſcens largae cedit ſuppurationi, cerato ſimplici ſervandae. Poſt hebdomada unam alteramve demergunt turbae cicatriceque tegi incipiunt exeſa loca. Omni ulteriori curae ſuperſedere poteſt medicus integritate, pro mali evolutione poſſibili, reſtituta; urgentibus nihilominus ſymptomatibus, irritantibus adſperſo Hydrargyri oxydati rubri, Euphorbii Sabinae foliorum pulvere, ſuppurationem denuo provocaturus. Reiterata cauterii applicatione eo magis opus eſt, quo proprius tertia inſtat periodus, quamvis perfectum auxilium ſerius tunc conſequatur.

Plenam ſalutem malo in tertiam transgreſſo periodum, exſpectari non poſſe, partibus exulceratis luxatoque femore liquet. Obices tamen obiiciamus, nitamur, progredienti deſtructioni iuvemusque naturae mirabilem in removendis curationis, reſorptione accita, obſtaculis efficaciam. Praeſentanea et hic e cauterio percipiemus commoda, ni puris cumulatio maximum attigerit gradum. Quo in caſu quaeſtio iam per longum tempus mota eſt, an arte transitus in quartam ſit accelerandus periodum, ut, tranſciſſa cute, pus, et mole et mixtione nocivum effluat, an maiore cum ſecuritate fluctuantis tumoris disruptio ſoli committa-

naturae. Graves pro utraque militant parte
oritates, ut in hunc diem lis nondum ſit com-
ta. Qui arte apertum cupiunt tumorem, nulla
via poſſe niſi puris remotione dolores ſedari,
in vicinas partes deſcenſum impediri caveri-
ab earum cutisque deſtructione perhibent.
erunt adverſarii, [1]) plurimis ſidiſſimisque ob-
ationibus effici, disſectionem maiorum absces-
m tantum abeſſe ut cum ullo inſtituatur emo-
ento, ut potius perſpicuae inde oriantur noxae,
s a celeri cutis collapſu aërisque atmoſphaerici
rticuli caveam ingreſſu derivarent ſequenteque
uinatione. Evitare incommoda opinabantur
gua inciſione. Aër attamen purus nullo modo
lit, ſed occluſus, depravatus. Ruſtius [2]) larga
idit integumenta inciſione, ut puri aërique liber
tus pateat, ut et absceſſus ambitum aptis ad-
di poſſit remediis. Tali inciſione, maior, qui ſpon-
eam tumoris disruptionem ſemper praegredi-
, evolvitur partium erethiſmus, ſaluberrimus, ut
leſcant ſecum invicem parietes. Horrente
ncce methodum aegrotante, punctione declivio-
absceſſus partis, provocata prius impoſitis irri-

1) Ford. l. c. S. 87. Calliſen. l. c. §. 701. p. 362.
2) l. c. §. 176. S. 117.

tantibus ut et traiecto, auxiliante acu candenti triquetra, ſetaceo, quod vegeta reactione, poſt nycthemeron ſuborta removerent, inflammatione, eodem ſucceſſu ſe potiturus eſſe ſperabant, ſuetam abſceſſuum curandorum rationem tunc ſequentes.

Pure copioſius profluente hecticaque febre in dies aucta, ſpes, mitiori hac via ſalutem reſtitutum iri, deiicienda eſt, ultimumque auxilium, fiſtularum forſan obviarum, dilatatio aut totius ſuperioris abſceſſus parietis tranſciſſio, ut ſanies foras alliciatur, emortuae oſſis particulae removeantur aptisque tota cavea pateat remediis, non arcendum erit, cum propoſita, imo et inſtituta femoris exarticulatio, [1]) funditus deletis mollibus partibus vicinisque oſſibus, difficulter fructum ſit receptura.

Quies, primis periodis ſummo neceſſaria, minutis doloribus et inflammatione cohibenda detumeſcentibusque adfectis partibus, cum motibus cautis, protractis Mercurii inunctionibus balneisque animalibus optime ab ancyloſi caveatur muſculorumque et tendinum coaleſcentia, aegerrime referanda.

Tertiae indicationis, therapiae generalis conſilia ſequentis, uberiore ſuperſedeamus perluſtratione.

---

1) Ford. l. c. S. 83. 84.

ΓHESES DEFENDENDAE.

I.

Pulmonum docimaſiae ſallacia probandae in-ìs poſt partum vitae auxilia.

II.

Deſiderantur pathognomonica hydrothoracis nomena.

III.

Habitus maximi in dignoſcendis morborum ge-ıus momenti.

IV.

Sectio lateralis optima cyſtotomiae methodus.

V.

Non omnibus medearis morbis.

VI.

Herniotomia ad inflammatoriam ſtringenda in-·rationem.

CURRICULUM VITAE

EX DECRETO GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS ADIECTUM.

Ego Carolus Ludovicus Lehmann, Berolini natus octavo Calendas Matias anni millefimi feptingentefimi nonagefimi quinti, humanioribus litteris, in gymnafio Berolinenfi inftructus, hyberno femeftri anni millefimi octingentefimi decimi alumnus receptus fum in inftitutum medico-chirurgicum militare, Friderici Guilelmi nomine illuftre. Caftra potentiffimi regis primo Gallico bello fequutus Berolinumque, conciliata pace, regreffus, abfolutis ftudiis academicis, militaris medici officium, quo adhuc fungor, fuscepi.

Ex illuftriffimis almae univerfitatis academiaeque militaris profefforibus praeceptoribus ufus fum in anatomia univerfa et practica Rudolphi et Knape; in zoologia Lichtenftein; in botanice beato

lldenow; in phyfice, chemia et pharmacia Tur- in phyfiologia Rudolphi, Horkel et de Koenen, et in pharmacologia; in femiotice, pathologia generali tum fpeciali Horn et F. Hufeland; herapia utroque Hufeland et Horn; in univerfa rurgia Murfinna, Graefe, Ruft et Kluge, cuius de obftetricia arte lectionibus adfui. Cetero annum in caritatis nofocomio medicinam feci.

Tentamine et examine rigorofo coram gratiofo dicorum ordine peractis defenfaque differta- ne, fpero fore ut fummis impertiar medicinae hirurgiae honoribus.
